

## DIFESA CETRIOLO

Avversità	Criteri di intervento	S.a. e Ausiliari	Limitazioni d'uso e note
<b>CRITTOGAME</b>			
<b>Moria delle piantine</b> ( <i>Pithyium spp.</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Avvicendamenti colturali ampi; -Cura dell'irrigazione; -Evitare quando possibile trapianti troppo anticipati. <b>CHIMICO:</b> -Trattamento sulle piantine prima del trapianto avendo cura di bagnare il vasetto di torba (assorbimento radicale); -interventi tempestivi alle prime morie di piantine post- trapianto.	Propamocarb (1) Propamocarb + Fosetil (2)	(1) Trattamenti in semenzaio o al terreno in pre trapianto (2) Trattamento in semenzaio o al terreno in post trapianto con impianto a goccia o distribuzione localizzata
<b>Marciume molle</b> ( <i>Phitophthora spp</i> ) ( <i>Pythium spp</i> ) ( <i>Rhizoctonia solani</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Avvicendamenti colturali ampi; -Utilizzo di varietà tolleranti/resistenti, -Utilizzo di seme sano o conciato; -Utilizzo di piantine sane.		Nessun intervento chimico
<b>Peronospora</b> ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Raccogliere e distruggere i residui delle colture precedenti infette; -Favorire l'arieggiamento in coltura protetta; -Limitare le irrigazioni, soprattutto alla parte aerea delle piante. <b>CHIMICO:</b> -Intervenire solo quando sono presenti i primi sintomi e/o si instaurano le condizioni meteorologiche favorevoli al fungo.	Prodotti rameici Fosetil Alluminio Fosetil Alluminio + Rame Propamocarb Famoxadone + Cimoxanil (1) Azoxistrobin (1) Ciazofamide (2) Fluopicolide (3)	1) Tra Azoxystrobin, trifloxystrobin e Famoxadone 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (2) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale (3) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale
<b>Mal bianco</b> ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> ) ( <i>Sphaerotheca fuliginea</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Utilizzare varietà resistenti/tolleranti; -Curare l'arieggiamento in coltura protetta; -Evitare uno sviluppo eccessivo della vegetazione (regolando la concimazione). <b>CHIMICO:</b> - I trattamenti devono essere effettuati alla comparsa dei primi sintomi e ripetuti ad intervalli variabili da 7 a 14 giorni, in relazione alla persistenza del principio attivo e all'andamento stagionale; -E' ottima norma alternare fungicidi a differente meccanismo d'azione.	Zolfo (1) Bitertanolo (2) Difenoconazolo (2) Miclobutanil (2) Penconazolo (2) Fenbuconazolo (2) Tetraconazolo (2) Tebuconazolo (2) Azoxistrobin (3) Trifloxystrobin (3) Meptyldinocap (4) Bupirimate	(1) Si consiglia di ridurre la dose d'impiego per evitare fenomeni di fitotossicità (2) Al massimo 3 trattamenti con IBE per ciclo colturale (3) Tra Azoxystrobin, trifloxystrobin e Famoxadone 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (4) Massimo 2 interventi all'anno
<b>Sclerotinia</b> ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici; -Eliminare e distruggere le piante ammalate; -In coltura protetta abbassare l'umidità arieggiando sin dal mattino; -Evitare se possibile lesioni alle piante; -Ricorrere alla solarizzazione in coltura protetta.		Nessun intervento chimico

<b>Avversità</b>	<b>Criteri di intervento</b>	<b>S.a. e Ausiliari</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Botrite</b> ( <i>Botrytis cinerea</i> )	<b>Agronomici:</b> -Favorire l'arieggiamento in coltura protetta; -Curare l'irrigazione e favorire il drenaggio del terreno; -Utilizzare dove possibile insetti pronubi; -Evitare lesioni alle piante.	<i>Trichoderma Harzianum</i> <i>Trichoderma viride</i> Fenexamid Pyrimethanil (1) (2) Ciprodinil + Fludioxinil (3)	(1) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale (2) Impiegabile solo in coltura protetta (3) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale
<b>Antracnosi</b> ( <i>Colletotrichum lagenarium</i> )  <b>Cladosporiosi</b> ( <i>Cladosporium cucumerinum</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Utilizzo di varietà tolleranti o resistenti; -Utilizzo di seme sano o conciato; -Utilizzo di piantine sane; -Avvicendamenti culturali ampi; -Limitare le irrigazioni e i ristagni idrici del terreno; -In coltura protetta abbassare l'umidità arieggiando fin dal mattino, evitare temperature medio - basse (Cladosporiosi T°opt. 17 °C). <b>CHIMICO:</b> -I trattamenti vanno effettuati in presenza di condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo del patogeno.	Prodotti rameici	
<b>Tracheo - fusariosi</b> ( <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>melonis</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Utilizzo di varietà tolleranti o resistenti; -Utilizzo di seme sano o conciato; -Utilizzo di piantine sane; -Avvicendamenti culturali -Curare l'irrigazione e favorire il drenaggio del terreno; -Innesto su specie erbacee resistenti (es. Benincasa cerifera); -Evitare lesioni alle radici al trapianto (es. usare piantine allevate in blocchetti di torba); -Utilizzare fertilizzanti in grado di stimolare i meccanismi di resistenza naturale delle piante.	<i>Streptomyces griseoviridis</i>	
<b>Batteriosi</b> ( <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> ) ( <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Utilizzo di seme controllato; -Utilizzo di piantine sicuramente sane; -Avvicendamenti culturali Ampi; -Concimazioni azotate e potassiche equilibrate; -Eliminazione della vegetazione infetta che non va comunque interrata; -Non utilizzare acque stagnanti; -Utilizzare fertilizzanti in grado di stimolare i meccanismi di resistenza naturale delle piante. <b>CHIMICO:</b> -Trattare dopo le operazioni colturali che possono causare ferite.	Prodotti rameici	
<b>Virosi</b> (CMV, ZYMV, WMV-2) (MYSV)	-Per tutte le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (virus del mosaico del cetriolo CMV, virus del mosaico giallo dello zucchini ZYMV, virus 2 del mosaico del cocomero WMV-2) valgono le stesse considerazioni generali di prevenzione degli afidi; -Per il trapianto è importante usare piantine ottenute in sementali prodotti in vivai con sicura o opportuna protezione dagli afidi.		

<b>Avversità</b>	<b>Criteri di intervento</b>	<b>S.a. e Ausiliari</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Afide delle cucurbitacee</b> ( <i>Aphis gossypii</i> )	<b>BIOLOGICO:</b> -Distribuire gli ausiliari con le dosi e con la frequenza di lancio testate nella realtà locale; -Se l'attacco è precoce, intervenire in maniera localizzata, con un aficida specifico e, possibilmente, selettivo; -E' consigliabile per contenere dei focolai d'infezione e preservare gli ausiliari, effettuare dei lavaggi con prodotti tensioattivi specifici; -Nel caso si effettuino lanci di ausiliari, l'eventuale trattamento aficida o contro altri fitofagi dovrà essere distanziato di un intervallo di giorni sufficiente dall'inizio dei lanci. <b>CHIMICO:</b> <b>-Intervenire tempestivamente alla presenza delle prime colonie;</b> -E' comunque consigliabile, quando possibile, ricorrere a trattamenti localizzati che consentano un parziale rispetto dell'entomofauna utile.	<i>Beauveria bassiana</i> Fluvalinate (1) (2) Bifentrin (1) Imidacloprid (3) Thiamethoxam (3) Acetamiprid (3) (4) Flonicamid (5) Pymetrozine Azadiractina	<b>(1) Al massimo 2 interventi con piretroidi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità</b> <b>(2) Non utilizzare in coltura protetta</b> <b>(3) Al massimo 1 intervento per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità. Intervenire nelle prime fasi post trapianto</b> <b>(4) Solo in coltura protetta</b> <b>(5) al massimo 2 interventi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità</b>
<b>Mosca bianca delle serre</b> ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> ) ( <i>Bemisia tabaci</i> )	<b>FISICO:</b> -In coltura protetta si consiglia di utilizzare idonee reti da installare all'inizio del ciclo colturale, per limitare la diffusione degli adulti; -Utilizzare plastiche di copertura fotoselettive con effetto repellente per gli insetti. <b>BIOLOGICO:</b> -In coltura protetta distribuire i pupari di encarsia con le dosi e con la frequenza di testate nella realtà locale e in ogni; caso variabile a seconda del periodo di coltivazione e del grado di infestazione; -E' consigliabile per contenere dei focolai d'infezione e preservare gli ausiliari, effettuare dei lavaggi con prodotti tensioattivi specifici; -Utilizzare trappole cromotropiche di colore giallo per il monitoraggio. <b>CHIMICO:</b> <b>- Intervenire alla comparsa delle infestazioni;</b> -E' buona norma alternare fra di loro i principi attivi a diverso meccanismo d'azione.	<i>Encarsia formosa</i> <i>Beauveria bassiana</i> Azadiractina Buprofezin Thiamethoxan (1) Imidacloprid (1) Thiacloprid (1) Acetamiprid (1) (5) Pyriproxyfen (3) Flonicamid (4) Pymetrozine	<b>(1) Al massimo 1 intervento per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità. Intervenire nelle prime fasi post trapianto</b> <b>(2) Al massimo 1 intervento per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità</b> <b>(3) Ammesso solo in coltura protetta</b> <b>(4) al massimo 2 interventi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità</b> <b>(5) Solo in coltura protetta</b>
<b>Minatrice</b> ( <i>Lyriomiza spp.</i> )	<b>BIOLOGICO:</b> -Distribuire gli ausiliari con le dosi e con la frequenza di lancio testate nella realtà locale; -Utilizzare trappole gialle collate per rilevare la presenza dell'insetto. <b>AGRONOMICO</b> -Eliminare i residui di coltivazione; -Impiegare la pacciamatura, che impedisce l'impupamento delle larva nel terreno. <b>CHIMICO:</b> <b>-Intervenire alla comparsa delle prime mine sulle foglie, in caso di scarsa parassitizzazione di Diglyphus isaea.</b>	<i>Dygliphus isaea</i> Ciromazina (1) Abamectina (1) Spinosad (2) Azadiractina	<b>(1) Al massimo 1 intervento per ciclo colturale</b> <b>(2) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità</b>
<b>Tripide americano</b> ( <i>Frankliniella occidentalis</i> )	<b>CAMPIONAMENTI</b> -Impiegare trappole cromotropiche (azzurre) per il monitoraggio (1 ogni circa 50 mq). <b>BIOLOGICO:</b> -Distanziare il lancio del predatore da eventuali trattamenti contro altri fitofagi, in funzione della S.a. utilizzata. <b>CHIMICO:</b> <b>-Presenza accertata del fitofago.</b>	<i>Orius spp.</i> Spinosad (1) Acrinatrina (2) Abamectina (3) Azadiractina	<b>(1) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità</b> <b>(2) Al massimo 1 intervento sull'avversità. Al massimo 2 interventi con piretroidi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità</b> <b>(3) Al massimo 1 intervento per ciclo colturale</b>

<b>Avversità</b>	<b>Criteri di intervento</b>	<b>S.a. e Ausiliari</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Mosca</b> ( <i>Delia spp</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -In semenzaio utilizzare torba non infestata; -In pieno campo non trapiantare molto anticipatamente o con terreni troppo freddi o umidi. <b>CHIMICO:</b> -In caso di presenza accertata e generalizzata.	Deltametrina (1)	(1) Al massimo 2 interventi con piretroidi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità
<b>Ragnetto rosso</b> ( <i>Tetranychus urticae</i> )	<b>BIOLOGICO:</b> -Alla prima comparsa dei focolai d'infestazione effettuare lanci di predatori (fitoseidi) con le dosi e con la frequenza di lancio testate nella realtà locale; -Distanziare il lancio da eventuali trattamenti contro altri fitofagi, in funzione della S.a. utilizzata. <b>CHIMICO:</b> -Alla comparsa dei primi focolai d'infestazione con foglie decolorate; -Possibilmente utilizzare S.a. selettive nei confronti dei fitoseidi.	<i>Phytoseiulus persimilis</i> <i>Beauveria bassiana</i> Exitiazox (1) Abamectina (1) Fenazaquin (1) Fenpiroximate (1)	Lo zolfo utilizzato eventualmente su oidio ha un effetto di contenimento sulle infestazioni del ragnetto (1) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità controllata
<b>Nottue fogliari</b> ( <i>Heliothis armigera</i> ) ( <i>Spodoptera littoralis</i> ) ( <i>Autographa gamma</i> ) (ecc.)	<b>CHIMICO:</b> -Presenza accertata di giovani larve.	<i>Bacillus thuringiensis</i> Ciflutrin (1) Deltametrina (1) Zetacipermetrina (1) Lambda-cialotrina (1) Indoxacarb (3) Spinosad (4) Azadiractina	(1) Al massimo 2 interventi con piretroidi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità (2) Non utilizzare in serra (3) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale (4) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità. Ammesso solo su <i>Heliothis armigera</i> e <i>Spodoptera littoralis</i>
<b>Nottue terricole</b> ( <i>Agrotis sp.</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Eseguire lavorazioni superficiali nell'interfila che modificano l'umidità del terreno e favoriscono al discesa delle larve negli strati più profondi; -Asportare i residui di coltivazione; -Le lavorazioni superficiali sono utili nell'impedire la schiusura delle uova. <b>CHIMICO:</b> -Intervenire solo in caso d'accertata presenza e con diffuse infestazioni.	Ciflutrin (1) Deltametrina (1) Azadiractina	(1) Al massimo 2 interventi con piretroidi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità
<b>Chioccioline e limacee</b> ( <i>Helix spp.</i> ) ( <i>Cantareus aperta</i> ) ( <i>Helicella variabilis</i> ) ( <i>Limax spp.</i> ) ( <i>Agriolimax spp.</i> )	<b>CHIMICO:</b> -Solo in caso di infestazione generalizzata;	Metaldeide-esca	Distribuire il prodotto sulle fasce perimetrali o solo nelle zone interessate.

<b>Avversità</b>	<b>Criteri di intervento</b>	<b>S.a. e Ausiliari</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Nematodi galligeni</b> ( <i>Meloidogyne spp.</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> - Avvicendamenti colturali con specie poco sensibili; - Possibilmente eliminare e distruggere i residui della coltura precedente; - Evitare ristagni idrici; - Uso di varietà resistenti; - Innesto su specie tolleranti o resistenti; - Utilizzo in precessione colturale di specie da sovescio con attività bio-nematocida; - Utilizzo di pannelli di semi di brassica. <b>FISICO:</b> - Ricorrere alla solarizzazione (in coltura protetta). <b>CHIMICO:</b> - In terreni sabbiosi; - Presenza accertata o se nell'anno precedente ci siano stati danni.	Fenamifos (1) (2) (4) Oxamil (1) (3) (4) Dazomet (1) (4) Metam Na (1) (4) (5) Metam K (1) (4) (5) Azadiractina (6)	<b>(1)</b> Intervenire previa autorizzazione dell'organo tecnico competente <b>(2)</b> Intervenire con formulati liquidi in maniera localizzata tramite impianti di microirrigazione in pre e post-trapianto. Fare attenzione ai 60 gg di tempo di carenza. Al massimo 1 intervento per ciclo colturale <b>(3)</b> Intervenire in modo localizzato tramite impianto di irrigazione con la coltura in atto con formulati liquidi. Al massimo 30 litri di formulato commerciale per ciclo <b>(4)</b> Ammesso solo in coltura protetta <b>(5)</b> Interventi in pre trapianto, in alternativa al Fenamifos <b>(6)</b> Intervenire su coltura pacciamata, in modo localizzato, tramite impianto di irrigazione

#### FITOREGOLATORI CETRIOLO

<b>Tipo di impiego</b>	<b>S.a. impiegabile</b>	<b>Note e limitazioni d'uso</b>
<b>Allegante</b>	NOA	In serra con le basse temperature
<b>Allegante anticascola</b>	BNOA	In serra con le basse temperature