

## DIFESA COCOMERO

Avversità	Criteri di intervento	S.a. e Ausiliari	Limitazioni d'uso e note
<b>CRITTOGAME</b>			
<b>Moria delle piantine</b> ( <i>Pithyum spp.</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Avvicendamenti colturali; -Cura dell'irrigazione; -Evitare quando possibile trapianti troppo anticipati. <b>CHIMICO:</b> -Trattamento sulle piantine prima del trapianto avendo cura di bagnare il vasetto di torba (assorbimento radicale). -interventi tempestivi alle prime morie di piantine post- trapianto.	Propamocarb (1) Propamocarb + Fosetil (2)	(1) Trattamenti in semenzaio o al terreno in pre trapianto (2) Trattamento in semenzaio o al terreno in post trapianto con impianto a goccia o distribuzione localizzata
<b>Tracheofusariosi</b> ( <i>Fusarium niveum</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Ampie rotazioni; -Utilizzo varietà resistenti/tolleranti; -Innesto erbaceo su portinnesti resistenti/tolleranti; -Utilizzare fertilizzanti in grado di stimolare i meccanismi di resistenza naturale delle piante.		
<b>Sclerotinia</b> ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -In serra arieggiare di frequente; -limitare le irrigazioni; -Eliminare immediatamente le piante ammalate, -Evitare lesioni alle piante. <b>CHIMICO:</b> -Intervento da effettuarsi solamente per limitare il diffondersi dell'evento fitopatogeno	Dicloran (1)	(1) Al massimo 1 intervento localizzato al colletto della piantine
<b>Antracnosi</b> ( <i>Colletotrichum lagenarium</i> )  <b>Cladosporiosi</b> ( <i>Cladosporium cucumerinum</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Utilizzo di varietà tolleranti o resistenti, utilizzo di seme sano o conciato; -Avvicendamenti colturali. <b>CHIMICO:</b> -In pieno campo i trattamenti vanno effettuati ogni 6-10 giorni solo in caso di presenza dei sintomi e di condizioni climatiche particolarmente favorevoli al patogeno.	Prodotti rameici	
<b>Peronospora</b> ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Raccogliere e distruggere i residui delle colture precedenti infette; -Limitare le irrigazioni, soprattutto sulla parte aerea delle piante e curare il drenaggio del terreno; -Curare l'areggiamento in coltura protetta; -Evitare uno sviluppo eccessivo della vegetazione (regolando la concimazione). <b>CHIMICO:</b> -Si effettuano solo in casi eccezionali.	Prodotti rameici Fosetil Alluminio Fosetil Al. + rame Metalaxil M + rame (1) Iprovalicarb + rame (2) Azoxistrobin (3)	(1) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale (2) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale (3) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità
<b>Alternariosi</b> ( <i>Alternaria alternata</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Utilizzare varietà resistenti o tolleranti; -Curare l'areggiamento in coltura protetta; -Evitare uno sviluppo eccessivo della vegetazione (regolando la concimazione). <b>CHIMICO:</b> -I trattamenti devono essere effettuati alla comparsa dei primi sintomi.	Prodotti rameici	

<b>Avversità</b>	<b>Criteri di intervento</b>	<b>S.a. e Ausiliari</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Cancro gommoso</b> ( <i>Didymella bryoniae</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Impiego di seme sano o accuratamente conciato; -Alcune varietà sono resistenti o tolleranti a questa malattia. <b>CHIMICO:</b> -Intervenire tempestivamente in caso d'infezioni in atto per limitare i danni e la diffusione del patogeno.	Prodotti rameici Azoxystrobin (1)	(1) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità
<b>Oidio Mal bianco</b> ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> ) ( <i>Sphaerotheca fuliginea</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Utilizzare varietà resistenti o tolleranti; -Curare l'arieggiamento in coltura protetta; -Evitare uno sviluppo eccessivo della vegetazione (regolando la concimazione). <b>CHIMICO:</b> -I trattamenti devono essere effettuati alla comparsa dei primi sintomi e ripetuti ad intervalli variabili da 7 a 10 giorni, in relazione alla persistenza del principio attivo e all'andamento stagionale; -E' ottima norma alternare fungicidi a differente meccanismo d'azione.	Zolfo (1) Bupirimate Quinoxifen (2) Fenbuconazolo (3) Miclobutanil (3) Tetraconazolo (3) Tebuconazolo (3) Trifloxystrobin (4) Azoxystrobin (4) Meptyldinocap (5)	(1) Evitare trattamenti con temperature elevate (2) Non utilizzare in serra (3) Al massimo 3 interventi con IBE per ciclo colturale (4) Complessivamente tra Azoxystrobin e Trifloxystrobin non più di 2 interventi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità (5) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale
<b>Batteriosi</b> ( <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> ) ( <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Utilizzo di seme controllato; -Avvicendamenti colturali; - Concimazioni potassiche azotate e potassiche equilibrate; -Utilizzare fertilizzanti in grado di stimolare i meccanismi di resistenza naturale delle piante. -Eliminazione della vegetazione infetta che non va comunque interrata. <b>CHIMICO:</b> -Trattare dopo le operazioni colturali che possono causare ferite.	Prodotti rameici	
<b>Virosi</b> (CMV, ZYMV, WMV-2) (SQMV)	-Per tutte le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (virus del mosaico del cetriolo CMV, virus del mosaico giallo dello zucchini ZYMV, virus 2 del mosaico del cocomero WMV-2) valgono le stesse considerazioni generali di prevenzione degli afidi; -Per il trapianto è importante usare piantine ottenute in sementali prodotti in vivai con sicura o opportuna protezione dagli afidi.		
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Minatrice</b> ( <i>Liriomyza spp.</i> )	<b>CAMPIONAMENTI</b> -Si consiglia di monitorare la presenza del fitofago mediante trappole cromotropiche. <b>CHIMICO:</b> -Effettuare i trattamenti alla presenza delle prime mine, in caso di scarsa parassitizzazione di <i>Diglyphus isaea</i> .	<i>Diglyphus isaea</i> Ciromazina Spinosad Azadiractina	Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità
<b>Afidi</b> ( <i>Aphis gossypii</i> )	<b>BIOLOGICO:</b> -Nel caso si debbano effettuare lanci di ausiliari, l'eventuale trattamento contro altri fitofagi dovrà essere distanziato di un intervallo di giorni sufficiente dall' inizio dei lanci. <b>CHIMICO:</b> -trattamenti tempestivi alla presenza delle prime colonie; -E' comunque consigliabile, quando possibile, ricorrere a trattamenti localizzati che consentano un parziale rispetto dell'entomofauna utile.	Ciflutrin + Imidacloprid (1) (2) Imidacloprid (2) Thiamethoxam (2) Etofenprox (3) Flonicamid (4) Pymetrozine Azadiractina	(1) Al massimo 2 interventi con piretroidi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità (2) Al massimo 1 intervento con neonicotinoidi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità (3) Al massimo 1 intervento per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità (4) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità

<b>Avversità</b>	<b>Criteri di intervento</b>	<b>S.a. e Ausiliari</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Tripidi</b> ( <i>Frankliniella occidentalis</i> ) ( <i>Thrips tabaci</i> )	<b>CMPIONAMENTI</b> -Impiegare trappole cromotropiche (azzurre) per il monitoraggio (1 ogni circa 50 mq). <b>BIOLOGICO:</b> -Distanziare il lancio del predatore dall'eventuale trattamento aficida, in funzione del p.a. utilizzato. <b>CHIMICO:</b> <b>-Presenza accertata del fitofago.</b>	<i>Orius laevigatus</i> (1) Azadiractina Spinosad (2)	<b>Gli interventi chimici contro questa avversità sono ammessi soltanto in coltura protetta</b> (1) Si suggerisce l'impiego degli ausiliari in coltura protetta <b>(2) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità</b>
<b>Aleurodidi</b> ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> ) ( <i>Bemisia tabacii</i> )	<b>CAMPIONAMENTI :</b> Controllare la presenza di neanidi sulla pagina inferiore delle foglie. <b>BIOLOGICO:</b> -Nel caso si debbano effettuare lanci di ausiliari, l'eventuale trattamento contro altri fitofagi dovrà essere distanziato di un intervallo di giorni sufficiente dall'inizio dei lanci. -Utilizzare trappole attrattive di colore giallo, posizionandone in serra una ogni 100 mq di coltura. <b>CHIMICO:</b> <b>-Intervenire alla presenza del fitofago;</b> -Privilegiare gli interventi in fertirrigazione con i prodotti su cui è ammessa questa pratica.	<i>Encarsia formosa</i> <i>Beauveria bassiana</i> Buprofezina Imidacloprid (1) Thiamethoxam (1) Thiacloprid (1) Etofenprox (2) Flonicamid (3) Pymetrozine Azadiractina	<b>Al massimo 1 intervento all'anno contro questa avversità</b> <b>(1) Al massimo 1 intervento con neonicotinoidi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità</b> <b>(2) Al massimo 1 intervento per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità</b> <b>(3) al massimo 2 interventi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità</b>
<b>Ragnetto rosso</b> ( <i>Tetranychus urticae</i> )	<b>BIOLOGICO:</b> - Lancio di ausiliari alla prima comparsa del fitofago; - Distanziare il lancio del predatore dall'eventuale trattamento contro altri fitofagi, in funzione del p.a. utilizzato. <b>CHIMICO:</b> <b>-Intervenire In presenza di focolai di infestazione con foglie decolorate.</b>	<i>Phytoseiulus persimillis</i> Exitiazox Fenazaquin Tebufenpirad Abamectina	<b>Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità</b>
<b>Mosca</b> ( <i>Delia Spp.</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Impiegare piantine esenti da attacchi del fitofago.		<b>Non sono ammessi interventi chimici</b>
<b>Nottue fogliari</b> ( <i>Heliothis armigera</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , ecc)	<b>CAMPIONAMENTI :</b> -Si consiglia di monitorare i voli degli adulti mediante trappole a feromoni; Monitorare la presenza di ovideposizioni. <b>CHIMICO:</b> <b>-Presenza accertata di giovani larve.</b>	Spinosad (1) Indoxacarb (2) Etofenprox (3) Lambda-cialotrina (4) Azadiractina	<b>(1) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità</b> <b>(2) Al massimo 3 interventi per ciclo colturale</b> <b>(3) Al massimo 1 intervento per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità</b> <b>(4) Al massimo 2 interventi con piretroidi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità</b>
<b>Nottue terricole</b> ( <i>Agrotis spp.</i> )	<b>CHIMICO:</b> <b>-Presenza accertata di larve.</b>	Teflutrin (1) Etofenprox (2)	<b>(1) Intervento localizzato al trapianto lungo la fila, non utilizzare in serra</b> <b>(2) Al massimo 1 intervento per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità</b>
<b>Insetti terricoli</b> <b>Elateridi</b> ( <i>Agriotes spp.</i> )	<b>AGRONOMICO:</b> -Avvicendamenti culturali; -Eseguire lavorazioni superficiali nell'interfila che, modificano l'umidità del terreno e favoriscono la discesa delle larve negli strati più profondi; -Le lavorazioni superficiali sono utili nell'impedire la schiusura delle uova; -La calcio cianamide granulare ha un'azione repellente nei confronti delle larve. <b>FISICO:</b> -Ricorrere alla solarizzazione (in coltura protetta ). <b>CHIMICO:</b> <b>-Intervenire in caso di terreni fortemente infestati</b>	Teflutrin (1)	<b>(1) Intervento localizzato al trapianto lungo la fila, non utilizzare in serra</b>

<b>Avversità</b>	<b>Criteri di intervento</b>	<b>S.a. e Ausiliari</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Nematodi galligeni</b> <i>(Meloidogyne spp.)</i>	<b>AGRONOMICO:</b> -Avvicendamenti colturali; -Utilizzo di varietà tolleranti o resistenti; -Innesto su specie tolleranti o resistenti; -Utilizzo in precessione colturale di specie con attività bio-nematocide; <b>FISICO:</b> -Ricorrere alla solarizzazione in colture protetta. <b>CHIMICO:</b> <b>-In terreni sabbiosi;</b> <b>-Solo in caso di presenza accertata o se nell'anno precedente ci siano stati danni.</b>	Fenamifos (1) (2) (4) Oxamil (1) (3) (4) Dazomet (1) (4) Metam Na (1) (5) (4) Metam K (1) (5) (4) Azadiractina (6)	<b>(1) Intervenire previa autorizzazione dell'organo tecnico competente</b> <b>(2) Intervenire in modo localizzato tramite impianti di irrigazione prima del trapianto o con colture in atto. Fare attenzione ai 60 gg di tempo di carenza. Al massimo 1 intervento per ciclo colturale</b> <b>(3) Intervenire in modo localizzato tramite impianto di irrigazione con la coltura in atto con formulati liquidi. Al massimo 30 litri di formulato commerciale per ciclo</b> <b>(4) Ammesso solo in coltura protetta</b> <b>(5) Interventi in pre trapianto, in alternativa al Fenamifos</b> <b>(6) Intervenire su coltura pacciamata, in modo localizzato tramite impianto di irrigazione con la coltura in atto con formulati liquidi</b>