

DISERBO ASPARAGO

| <i>Epoca d'impiego</i> | <i>Infestanti controllate</i> | <i>Sostanza attiva</i> | <i>% di S.a.</i> | <i>l o kg /ha</i> | <i>Limitazioni d'uso e note</i> |
|---|---------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|---|
| Pre-Trapianto Pre Ricaccio e/o Post Raccolta | Graminacee e Dicotiledoni | Glifosate Glufosinate - ammonio | 30,4 11,33 | 1,5 - 3 4 - 7 | Preparare definitivamente il terreno circa un mese prima dell'impianto (falsa semina) ed intervenire a pochi giorni dalla stessa Utilizzare in presenza di infestanti emerse |
| Pre Trapianto | Graminacee e Dicotiledoni | Clorprofam | 40,8 | 4 | |
| Pre ricaccio e Post raccolta | Graminacee e Dicotiledoni | Metribuzin (1) Pendimetanil (1) Dicamba Oxadiazon | 35 31,7 21 34,1 | 0,4 – 0,7 0,2 - 0,5 1,5 | E' opportuno alternare i prodotti nella fase di pre ricaccio per evitare che si selezionino specifiche malerbe (1) Rispettare 60 gg di carenza |
| Post raccolta | Graminacee | Propaquizafop Ciclossidim | 9,7 10,9 | 1 1,5 - 2,5 | |

E' vietato il diserbo chimico in coltura protetta