

DISERBO SPINACIO

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	30,4	1,5 - 3	Trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Lenacil	81,48	0,4 - 0,8	Usare la dose inferiore nei terreni sciolti
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Lenacil	81,48	0,4 - 0,8	Utilizzare con attenzione nei terreni sciolti
Post emergenza	Dicotiledoni	Fenmedifam	15,84	1 - 2,5	Eseguire dei saggi preliminari per verificare la selettività (1) 30 giorni di carenza (2) Non utilizzare formulati classificati Xn Per migliorare l'azione aggiungere gli attivanti quando consigliati in etichetta
		Fenmedifam + Lenacil	15,84+81,48	1-2 + 0,3-0,5	
	Graminacee	Quizalofop-etile-isomero D	4,9	1 - 1,5	
		Quizalofop-p-etile	5	1 - 1,5	
		Ciclossidim	10,9	1,5 - 2,5	
		Propaquizafop (1)	9,7	1	
		Diclofop-metile (1) (2)	27	2,5	

E' vietato il diserbo chimico in coltura protetta