



DISERBO ASPARAGO

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre-Trapianto Pre Ricaccio e/o Post Raccolta	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	30,4	1,5 - 3	Preparare definitivamente il terreno circa un mese prima dell'impianto (falsa semina) ed intervenire a pochi giorni dalla stessa Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Post trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Pyridate	45,0	1,3 - 2	Massimo 2 Kg di prodotto all'anno
Pre Trapianto	Graminacee e Dicotiledoni				
Pre ricaccio e Post raccolta	Graminacee e Dicotiledoni	Metribuzin (1) Pendimetanil (1) Dicamba (2) Oxadiazon (3)	35 38,72 21,2 34,1	0,4 - 0,7 2,50 0,2 - 0,5 1,5	E' opportuno alternare i prodotti nella fase di pre ricaccio per evitare che si selezionino specifiche malerbe (1) Rispettare 60 gg di carenza (2) Interventi ammessi solo dopo l'emergenza dei turioni (3) Interventi effettuabili dopo la rincalzatura o prima dell'emergenza dei turioni
Post raccolta	Graminacee	Propaquizafop Ciclossidim	9,7 10,9	1 1,5 - 2,5	

E' vietato il diserbo chimico in coltura protetta