



DISERBO CICORIA

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre-semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	30,4	1,5 - 3	(1) Solo preparazione di letti di semina o di trapianto Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Pre-Trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	30,4	1,5 - 3	Preparare definitivamente il terreno circa un mese prima dell'impianto (falsa semina) ed intervenire a pochi giorni dalla stessa. Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Pre Trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Oxadiazon (1) Pendimetalin (2)	34,1 38,72	1 1 -1,5	(1) Dopo la distribuzione il prodotto deve essere interrato (2) Non utilizzare in terreni sciolti
Pre semina e Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Benfluralin (1)	19,2	6,50	(1) Interrare il prodotto dopo la distribuzione
Pre e post semina e Pre e post trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Propizamide (1)	36	1,75 - 3,75	(1) Per interventi in post-emergenza delle infestanti, utilizzare solo in autunno inverno con terreno umido.
Pre emergenza e Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Clorprofam	40,8	2	
Post emergenza e Post trapianto	Graminacee	Ciclossidim Propaquizafop Quizalofop-p-etile	10,9 9,7 5	2 - 3 1 - 1,2 1 - 1,5	Le dosi variano in funzione delle infestanti da controllare

E' vietato il diserbo chimico in coltura protetta