



DISERBO FAGIOLO

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	30,4	1,5 - 3	Trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin (1) S-Metolaclo Clomazone Benfluralin (2)	38,72 86,49 30,74	1,75 1 0,2 - 0,3	Meglio su terreno umido Distribuire su seme ben coperto (1) Da impiegare in alternativa a Benfluralin (2) Da impiegare in alternativa a Pendimetalin
Post emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Imazamox (1) Pyridate (2) Imazamox + Bentazone	3,7 45,0 43,1 + 2	0,5 - 0,75 1,3 - 2 1,25	(1) Intervenire con la coltura a 2 - 4 foglie vere (2) Massimo 2 Kg di prodotto all'anno
	Dicotiledoni	Bentazone	87	0,75	Coltura a 2 – 3 foglie vere
	Graminacee	Ciclossidim Propaquizafop	10,9 9,7	1,5 - 2,5 1	

E' vietato il diserbo chimico in coltura protetta