



## DISERBO SEDANO

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
<b>Pre semina Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	30,4	1,5 - 3	<b>Trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto</b> Utilizzare in presenza di infestanti emerse
<b>Pre semina Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin (1)	31,7	2,5 - 3	<b>(1) Utilizzare formulati registrati sulla coltura</b>
<b>Post trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Linuron	37,6	0,5 - 1	<b>Usare la dose inferiore nei terreni sciolti</b> <b>Intervenire almeno 10 giorni dopo il trapianto e in ogni caso con la coltura allo stadio di 4 foglie vere</b> Preferire le dosi più basse e frazionare gli interventi
	Graminacee	Fluazifop – p - butile	13,37	1 - 1,2	

***E' vietato il diserbo chimico in coltura protetta***