



## DISERBO SPINACIO

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	30,4	1,5 - 3	<b>Trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto</b> Utilizzare in presenza di infestanti emerse
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Lenacil Metamitron	81,48 50	0,4 - 0,8 2 - 3	<b>Usare la dose inferiore nei terreni sciolti</b>
<b>Pre emergenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Lenacil (1) S-metolachlor (2) Metamitron Cloridazon + Metamitron (3)	81,48 86,5 50 21 + 31,1	0,4 - 0,8 0,50 2 - 3 2,5 - 3	(1) Utilizzare con attenzione nei terreni sciolti <b>(2) Utilizzabile nel periodo compreso tra febbraio ad Agosto</b> <b>(3) Nello stesso appezzamento al massimo 1 intervento ogni 3 anni</b>
<b>Pre semina Pre emergenza</b>	Graminacee	Triallate	45	3,6	<b>Al massimo 1 intervento per ciclo colturale</b>
<b>Post emergenza</b>	Dicotiledoni	Fenmedifam	15,84	1,25 - 2,5	Eseguire dei saggi preliminari per verificare la selettività
	Graminacee	Quizalofop-etile-isomero D Quizalofop-p-etile Ciclossidim Propaquizafop (1)	4,93 5 10,9 9,7	1 - 1,5 1 - 1,5 1,5 - 2,5 1	<b>(1) 30 giorni di carenza</b>  Per migliorare l'azione aggiungere gli attivanti quando consigliati in etichetta

***E' vietato il diserbo chimico in coltura protetta***