

CONFRONTO TRA LE DIVERSE FORMULAZIONI

LANSOPRAZOLO	Lansoprazolo Doc capsule	Lansoprazolo Eg capsule	Lansoprazolo Hexal capsule	Lansoprazolo Merck Generics capsule
	granuli gastroresistenti: ipromellosa (E-464), talco (E-553b), titanio biossido (E-171), copolimero dell'acido metacrilico-etil acrilato (1:1) dispersione 30%, trietilcitrate (E-1505), sfere di zucchero , acqua depurata;	«granuli»: zucchero sfere (amido di mais, saccarosio e acqua depurata), sodio laurilsolfato, meglumina, mannitolo, ipromellosa, macrogol 6000, talco, polisorbato 80, titanio diossido (E171), (acido metacrilicoetilacrilato copolimero, 1:1, dispersione 30%);	Saccarosio , amido di mais, ipromellosa (E464), talco (E 553b), titanio diossido (E 171), magnesio carbonato (E 504), acido metacrilico - etile acrilato copolimero (1:1) dispersione 30%, macrogol 400, silice colloidale (priva di acqua) (E 551).	zucchero sfere (amido di mais e saccarosio), sodio laurilsolfato, meglumina, mannitolo, ipromellosa, macrogol, talco, polisorbato 80, titanio diossido (E171), acido metacrilico-etile acrilato copolimero 1:1 dispersione 30%;
	capsula: gelatina, titanio biossido (E171), inchiostro nero	«capsule»: gelatina, titanio diossido, acqua depurata. Solo per le capsule da 15 mg: giallo di chinolina (E104)	Involucro della capsula: carragenina (E 407), potassio cloruro (E 508), titanio diossido (E 171), ipromellosa (E464).	opercolo delle capsule: gelatina, titanio diossido (E171). Solo nelle capsule da 15 mg: giallo chinolina (E104)
	Lansoprazolo Pliva capsule	Lansoprazolo Ratiopharm capsule	Lansoprazolo Teva capsule	
	contenuto della capsula: sfere di zucchero (contenenti saccarosio e amido di mais), carbossimetilamido sodico (tipo A), sodio laurilsolfato (tipo A), povidone (K30), oleato di potassio, acido oleico, ipromellosa. Copolimero acido metacrilico-etil acrilato, 1:1, dispersione 30% (contenete polisorbitolo 80 e sodio laurilsolfato), trietile citrato, titanio diossido (E-171), talco.	microgranuli: ipromellosa, lattosio monoidrato, crospovidone, glicerolo behenato, talco, titanio diossido (E171), silice anidra colloidale, copolimero acido metacrilico/etilacrilato, trietile citrato;	Zucchero sfere (saccarosio e amido di mais), Povidone, Sodio fosfato di basico diidrato, Sodio laurilsolfato, Acido metacrilico-etile acrilato copolimero (1:1) -dispersione 30 %, Talco, Macrogol, Titanio diossido (E171), Polisorbato 80	
	Involucro della capsula: gelatina, titanio diossido (E 171). Inchiostro: lacca, glicole propilenico, idrossido di ammonio, idrossido di potassio, ferro ossido nero (E172)	capsula: gelatina, titanio diossido (E171), sodio laurilsolfato; coloranti per stampa: gomma lacca, glicole propilenico, ossido di ferro nero (E172)	Corpo:Gelatina, Titanio diossido (E171) Cappuccio:Gelatina, Ossido di ferro rosso (solo 15 mg) (E172), Titanio diossido(E171)	
	lansox compresse orodispersibili	lansox capsule		
	Lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio carbonato, idrossipropilcellulosa poco sostituita, idrossipropilcellulosa, ipromellosa, titanio diossido, talco, mannitolo, copolimero acido metacrilico-etilacrilato (1:1) dispersione 30%, poliaccrilato dispersione 30%, Macrogol 8000, gliceril monostearato, polisorbato 80, trietil citrato, acido citrico anidro, ossido di ferro giallo (E172) e ossido di ferro rosso (E172), crospovidone, aroma di fragola, aspartame , magnesio stearato	Microgranuli inerti, saccarosio , copolimero acido metacrilico-etil acrilato (1:1) dispersione 30%, idrossipropilcellulosa poco sostituita, amido di mais, magnesio carbonato, talco, macrogol 8000, titanio diossido, idrossipropilcellulosa, polisorbato 80, silice colloidale anidra.		
		Capsula: gelatina, titanio diossido (E171), ossido di ferro rosso (E172).		

LANSOPRAZOLO	limpidex capsule	limpidex compresse orodispersibili	zoton cps	zoton compresse orodispersibili
	Microgranuli inerti, saccarosio, copolimero acido metacrilico-etil acrilato (1:1) dispersione 30%, idrossipropilcellulosa poco sostituita, amido di mais, magnesio carbonato, talco, macrogol 8000, titanio diossido, idrossipropilcellulosa, polisorbato 80, silice colloidale anidra.	Lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio carbonato, idrossipropilcellulosa poco sostituita, idrossipropilcellulosa, ipromellosa, titanio diossido, talco, mannitolo, copolimero acido metacrilico-etilacrilato (1:1) dispersione 30%, poliacrilato dispersione 30%, macrogol 8000, gliceril monostearato, polisorbato 80, trietil citrato, acido citrico anidro, ossido di ferro giallo (E172) e ossido di ferro rosso (E172), crospovidone, aroma di fragola, aspartame , magnesio stearato.	Microgranuli inerti, Saccarosio , Copolimero Acido Metacrilico-Etil Acrilato (1:1) dispersione 30%, Idrossipropilcellulosa poco sostituita, Amido di mais, Magnesio Carbonato, Talco, Macrogol 8000, Titanio diossido, Idrossipropilcellulosa, Polisorbato 80, Silice colloidale anidra. Capsula: Gelatina, Titanio diossido (E171), Ossido di Ferro Rosso (E172)	Lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio carbonato, idrossipropilcellulosa poco sostituita, idrossipropilcellulosa, ipromellosa, titanio diossido, talco, mannitolo, copolimero acido metacrilico-etilacrilato (1:1) dispersione 30%, poliacrilato dispersione 30%, Macrogol 8000, gliceril monostearato, polisorbato 80, trietil citrato, acido citrico anidro, ossido di ferro giallo (E172) e ossido di ferro rosso (E172), crospovidone, aroma di fragola, aspartame , magnesio stearato.
rabeprazolo	compresse pariet 10 mg	Pariet compresse 20 mg		
	Nucleo della compressa: mannitolo, ossido di magnesio, idrossipropilcellulosa a basso grado di sostituzione, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato. Rivestimento: etilcellulosa, ossido di magnesio. Rivestimento gastroenterico: idrossipropilmetilcellulosa ftalato, monogliceridi diacetilati, talco, biossido di titanio (E171), ossido di ferro rosso (E172), cera carnauba. Inchiostro: rivestimento ad uso farmaceutico, ossido di ferro nero (E172), glicole propilenico, antischiUMA A per medicinali.	Nucleo della compressa: Mannitolo, ossido di magnesio, idrossipropilcellulosa a basso grado di sostituzione, idrossipropilcellulosa, magnesio stearato. Rivestimento: etilcellulosa, ossido di magnesio. Rivestimento gastroenterico: idrossipropilmetilcellulosa ftalato, monogliceridi diacetilati, talco, biossido di titanio (E171), ossido di ferro giallo (E 172), cera carnauba. Inchiostro: gomma lacca per uso alimentare (E 904), ossido di ferro rosso (E 172), lecitina di soia (E 322), antischiUMA DC 1510.		

pantoprazolo	compresse Pantecta	compresse pantopan	compresse pantorc	compresse peptazol
	Sodio carbonato, mannitolo, crospovidone, povidone K90, calcio stearato, ipromellosa, povidone K25, glicole propilenico, acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio lauril solfato, trietilcitrate, titanio diossido E 171, ossido di ferro giallo E 172, inchiostro di stampa (gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo E 172, lecitina di soia, titanio diossido E 171, antischiuma DC 1510).	sodio carbonato, mannitolo, crospovidone, povidone K90, calcio stearato, ipromellosa, povidone K25, glicole propilenico, acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio lauril solfato, trietilcitrate, titanio diossido E171, ossido di ferro giallo E172, inchiostro di stampa (gomma lacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo E172, lecitina di soia, titanio diossido E171, antischiuma DC 1510)	Sodio carbonato, mannitolo, crospovidone, povidone K90, calcio stearato, ipromellosa, povidone K25, glicole propilenico, acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio lauril solfato, trietilcitrate, titanio diossido E 171, ossido di ferro giallo E 172, inchiostro di stampa (gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo E172, lecitina di soia, titanio diossido E171, antischiuma DC 1510).	Sodio carbonato, mannitolo, crospovidone, povidone K90, calcio stearato, ipromellosa, povidone K25, glicole propilenico, acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio lauril solfato, trietilcitrate, titanio diossido E 171, ossido di ferro giallo E 172, inchiostro di stampa (gomma lacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo E172, lecitina di soia, titanio diossido E171, antischiuma DC 1510).
omeprazolo	Antra cps rilascio modificato	omeprazolo Losec cps rilascio modificato	omeprazolo mepral cps rilascio modificato	omeprazolo omeprazen cps rilascio modificato
	Ogni capsula contiene i seguenti eccipienti: mannitolo, idrossipropilcellulosa, cellulosa microcristallina, lattosio anidro, sodio laurilsolfato, sodio fosfato bibasico diidrato, ipromellosa, acido metacrilico copolimero, macrogoli, magnesio stearato. Capsula contenitrice: ferro ossido rosso (E172), titanio biossido (E171), gelatina.	Ogni capsula contiene i seguenti eccipienti: mannitolo, idrossipropilcellulosa, cellulosa microcristallina, lattosio anidro, sodio laurilsolfato, sodio fosfato bibasico diidrato, ipromellosa, acido metacrilico copolimero, macrogoli, magnesio stearato. Capsula contenitrice: ferro ossido rosso (E172), titanio biossido (E171), gelatina.	Ogni capsula contiene i seguenti eccipienti: mannitolo, idrossipropilcellulosa, cellulosa microcristallina, lattosio anidro, sodio laurilsolfato, sodio fosfato bibasico diidrato, ipromellosa, acido metacrilico copolimero, macrogoli, magnesio stearato. Capsula contenitrice: ferro ossido rosso (E172), titanio biossido (E171), gelatina	Ogni capsula contiene i seguenti eccipienti: mannitolo, idrossipropilcellulosa, cellulosa microcristallina, lattosio anidro, sodio laurilsolfato, sodio fosfato bibasico diidrato, ipromellosa, acido metacrilico copolimero, macrogoli, magnesio stearato. Capsula contenitrice: ferro ossido rosso (E172), titanio biossido (E171), gelatina.
esomeoprazolo	Nexium compresse gastroresistenti	esomeprazolo Axagon compresse gastroresistenti		
	Glicerolo monostearato 40-55, iprolosa, ipromellosa, coloranti ferro ossido (compresse da 20 e 40 mg: rosso-bruno; compresse da 20 mg: giallo) (E 172), magnesio stearato, acido metacrilico copolimerizzato etilacrilato (1:1) dispersione al 30%, cellulosa microcristallina, paraffina sintetica, macrogoli, polisorbato 80, crospovidone, sodio stearil fumarato, zucchero granulare (saccarosio e amido di mais), talco, diossido di titanio (E 171), trietil citrato.	Glicerolo monostearato 40-55, iprolosa, ipromellosa, coloranti ferro ossido (compresse da 20 e 40 mg: rosso-bruno; compresse da 20 mg: giallo) (E 172), magnesio stearato, acido metacrilico copolimerizzato etilacrilato (1:1) dispersione al 30%, cellulosa microcristallina, paraffina sintetica, macrogoli, polisorbato 80, crospovidone, sodio stearil fumarato, zucchero granulare (saccarosio e amido di mais), talco, diossido di titanio (E 171), trietil citrato.		