



## Allegato n. 2

### PROTOCOLLO DI UTILIZZO DEL VACCINO INATTIVATO PER I SIEROTIPI BTV2 E BTV4

Il vaccino spento bivalente per i sierotipi BTV2 e BTV4, prodotto dalla Merial S.p.a., è disponibile per la campagna vaccinale degli animali della specie ovina e bovina.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna immagazzina i lotti inviati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise, sino al ritiro da parte dei Servizi veterinari delle ASL dei quantitativi a loro assegnati da parte del Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità.

Ciascun Ente, che provveda ad immagazzinare, anche temporaneamente, e a distribuire il vaccino, dovrà:

- garantire la corretta conservazione del vaccino sino alla sua distribuzione/utilizzazione;
- tenere un registro di carico e scarico conforme al modello riportato nella Scheda SBT08 (allegato alla nota del Ministero della Salute n. DGVA.VIII-2751-PI.8.d/18 del 06-02-2004), compilato secondo le istruzioni allegate alla stessa nota (Sezione 8). Nel registro di carico e scarico dovranno essere registrate anche le dosi di vaccino o di soluzione sterile andate distrutte per cause accidentali nel corso delle operazioni di vaccinazione.

I Servizi Veterinari locali assicurano che:

- la somministrazione del vaccino avvenga nei tempi e nei modi indicati nel programma di vaccinazione e nel rispetto delle buone pratiche veterinarie;
- gli interventi vaccinali effettuati nelle aziende siano accuratamente registrati utilizzando la Scheda SBT09 compilata secondo le istruzioni allegate alla stessa nota di cui sopra (Sezione 8);

I Servizi veterinari hanno la responsabilità di informare gli allevatori dei possibili effetti indesiderati provocati dalla vaccinazione contro la BT e contestualmente dei vantaggi della vaccinazione in relazione alla perdite legate alla presenza della malattia e dell'infezione.

Devono altresì informare gli allevatori dell'obbligo di segnalare immediatamente al Servizio Veterinario della ASL competente eventuali effetti indesiderati.

### Presentazione del vaccino inattivato per i sierotipi BTV2 e BTV4

Il vaccino è costituito da un flacone di propilene da 100 ml. (100 dosi), contenente una sospensione di virus inattivato dei sierotipi BTV2 e BTV4, adiuvato con idrossido di alluminio e saponina.

### Specie

Il vaccino è destinato agli animali della specie ovina e della specie bovina.

### Indicazioni

Protegge gli animali vaccinati dall'infezione, dalla viremia e dai sintomi clinici di malattia provocati dal virus della Blue tongue sierotipi BTV2 e BTV4.

### Controindicazioni

Nessuna allo stato delle conoscenze attuali.

### Effetti collaterali

La vaccinazione potrebbe provocare piccoli gonfiori nel sito dell'inoculo e/o lieve febbre, di breve durata.

### Precauzioni particolari

- Vaccinare solo animali in buono stato di salute;
- Prestare particolare attenzione agli animali in gravidanza;
- Somministrare il vaccino sterilmente.



### **Modalità di somministrazione**

Agitare prima dell'utilizzo evitando la formazione di bolle, poiché queste potrebbero aumentare la reazione locale nel sito di inoculo.

La dose è di **1 ml** da somministrare sottocute secondo il seguente schema vaccinale:

#### **OVINI Prima immunizzazione:**

- prima iniezione per gli ovini di età superiore ad 1 mese d'età (2 mesi ½ se figli di pecore vaccinate).
- seconda iniezione dopo 21-30 giorni dopo la prima.

#### **Richiamo annuale:**

Una iniezione entro un anno dall'ultima somministrazione di vaccino.

#### **BOVINI Prima immunizzazione:**

- prima iniezione a partire da 2 mesi ½ d'età;
- seconda iniezione dopo un mese dalla prima.

### **Movimentazione**

Gli ovini che hanno completato la prima immunizzazione o che sono stati sottoposti al richiamo annuale possono essere movimentati ai sensi del presente Decreto, dopo almeno 14 giorni e non oltre un anno dall'ultima vaccinazione.

I bovini che sono stati sottoposti alla seconda vaccinazione possono essere movimentati a partire dal 15° giorno fino al 6° mese dopo la seconda somministrazione, come previsto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. prot. . DGSAFV.III/22026/P-I.8.d/18 del 06-11-2008.

### **Sovradosaggio ed antidoti**

Nessun effetto eccetto quelli sopra citati sono stati osservati in caso di sovradosaggio.

### **Tempo di sospensione**

Nessuno

### **Incompatibilità**

Non miscelare con altri vaccini.

### **Modalità di conservazione**

Conservare tra i +2°C and +8°C. Dopo l'apertura del flacone il vaccino può essere utilizzato entro le 24 h successive se viene conservato a queste temperature. Tenere al riparo della luce. Non congelare.