

## DIFESA ERBA MEDICA

<b>Avversità</b>	<b>Criteri di intervento</b>	<b>S.a. e Ausiliari</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Afidi dei cereali</b> ( <i>Rhopalosiphum padi</i> ) ( <i>Metopolophium dirhodum</i> )	<b>CHIMICO:</b> -Non sono previsti interventi specifici.		Nessun intervento chimico
<b>Apion</b> ( <i>Apion pisi</i> )	<b>CHIMICO:</b> -In caso di elevata infestazione di adulti alla ripresa vegetativa o dopo il primo sflalcio.	Lambdacialotrina (1) Acetamiprid (2)	(1) Al massimo 1 intervento all'anno, indipendentemente dall'avversità (2) Al massimo 1 intervento all'anno, indipendentemente dall'avversità
<b>Fitonoma</b> ( <i>Metopolosiphum dirhodum</i> ) ( <i>Sitobion avenae</i> ) ( <i>Hypera variabilis</i> )  <b>Tichio</b> ( <i>Tichius flavus</i> )	<b>CHIMICO:</b> -In caso di elevata infestazione di larve prima dell'inizio della fioritura del primo sflalcio.	Lambdacialotrina (1)	(1) Al massimo 1 intervento all'anno, indipendentemente dall'avversità
<b>Lepidotteri defogliatori</b> ( <i>Nyssia Fiorentina</i> )	<b>CHIMICO:</b> -Non sono previsti interventi specifici.		Nessun intervento chimico
<b>Nottue defogliatrici</b> ( <i>Spp.</i> )	<b>CHIMICO:</b> -In caso di elevata infestazione di larve.	Lambdacialotrina (1) Deltametrina (2)	(1) Al massimo 1 intervento all'anno, indipendentemente dall'avversità (2) Al massimo 1 intervento all'anno