

**DISERBO CIPOLLA**

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
<b>Pre-semina e Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)  Glufosinate-ammonio	30,4  11,33	1,5 - 3  4 - 7	<b>(1) Trattamenti al terreno in assenza di colture</b> Utilizzare in presenza di infestanti emerse
<b>Pre-emergenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin (1) Glufosinate-ammonio Cloridazon (2) (3)	31.7 11.33 65	2 - 3 4 - 7 1	<b>(1) Utilizzare con attenzione nei terreni sabbiosi</b> <b>(2) Non impiegabile su terreni limosi</b> <b>(3) Al massimo 2,6 kg di sostanza attiva ogni tre anni sullo stesso campo</b>
<b>Pre - trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin (1)	31.7	2 - 4	Effettuare l'intervento su terreno ben preparato facendo seguire una leggera irrigazione e procedere al trapianto dopo almeno 7 - 8 giorni dall'intervento.
<b>Post emergenza e Post trapianto</b>	Dicotiledoni annuali	Ioxinil	33.2	0,1 - 0,6	Utilizzabile anche in epoca precocissima, utilizzando le dosi più basse Indicato per cipolle autunnali
	Graminacee e Dicotiledoni	Oxifluorfen (1)	22	0,05 - 0,5	<b>(1) Intervenire su colture dopo le 2 foglie vere</b> Da preferirsi dosaggi ridotti eventualmente ripetuti
	Dicotiledoni perennanti	Clopiralid	75	0,15	<b>Da utilizzare solo dopo la seconda foglia vera,</b> utilizzando dosi frazionate in proporzione allo sviluppo delle infestanti
	Graminacee	Fenoxaprop-p-etile Cicloxidim Propaquizafop Quizalofop-p-etile Quizalofop-etile Isomero D Diclofop-metile (1) (2)	6,64 21 9,7 5 4,9 26	1 - 1,5 0,75 - 1,25 1 - 1,2 1 - 1,5 1 - 1,5 2,5 - 3	<b>(1) Non utilizzare formulati classificati Xn</b> <b>(2) Solo formulati al 26%</b>