

DISERBO FAGIOLO

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	30,4	1.5 - 3	Trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Linuron Pendimetalin S-metolaclof Clomazone	37,6 38,72 86,49 30,74	0,5 - 1 1,75 1 0,2 - 0,3	Meglio su terreno umido Distribuire su seme ben coperto
Post emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Imazamox (1) Pyridate (2)	3,7 45,0	0,5 - 0,75 1,3 - 2	(1) Intervenire con la coltura a 2 - 4 foglie vere (2) Massimo 2 Kg di prodotto all'anno
	Dicotiledoni	Bentazone	87	0,75	Coltura a 2 – 3 foglie vere
	Graminacee	Ciclossidim Propaquizafop Diclofop-metile (1)	10,9 9,7 27	1,5 – 2,5 1 2,5 - 3	(1) Non utilizzare formulati classificati Xn

E' vietato il diserbo chimico in coltura protetta