



## Allegato n. 1

### PROTOCOLLO DI UTILIZZO DEL VACCINO INATTIVATO PER BTV 8

Ciascun Ente, che provveda ad immagazzinare, anche temporaneamente, e a distribuire il vaccino, dovrà:

- garantire la corretta conservazione del vaccino sino alla sua distribuzione/utilizzazione;
- tenere un registro di carico e scarico conforme al modello riportato nella Scheda SBT08 (allegato alla nota del Ministero della Salute n. DGVA.VIII-2751-PI.8.d/18 del 06-02-2004), compilato secondo le istruzioni allegate alla stessa nota (Sezione 8). Nel registro di carico e scarico dovranno essere registrate anche le dosi di vaccino o di soluzione sterile andate distrutte per cause accidentali nel corso delle operazioni di vaccinazione.

I Servizi Veterinari locali assicurano che:

- la somministrazione del vaccino avvenga nei tempi e nei modi indicati nel programma di vaccinazione e nel rispetto delle buone pratiche veterinarie;
- gli interventi vaccinali effettuati nelle aziende siano accuratamente registrati utilizzando la Scheda SBT09 compilata secondo le istruzioni allegate alla stessa nota di cui sopra (Sezione 8);

I Servizi veterinari devono informare gli allevatori dell'obbligo di segnalare immediatamente al Servizio Veterinario della ASL competente eventuali effetti indesiderati.

#### Presentazione del vaccino

Il vaccino è costituito da un flacone di propilene da 100 ml. (100 dosi), contenente una sospensione di virus inattivato del sierotipo BTV8 adiuvato con idrossido di alluminio e saponina.

#### Specie

Per la campagna vaccinale di cui al presente decreto il vaccino è destinato agli animali delle specie bovina, ovina.

#### Indicazioni

Protegge gli animali vaccinati dall'infezione, dalla viremia e dai sintomi clinici di malattia provocati dal virus della Blue tongue sierotipi BTV8 a partire dal 21° giorno dopo il richiamo.

#### Controindicazioni

Nessuna allo stato delle conoscenze attuali.

#### Effetti collaterali

La vaccinazione potrebbe provocare piccoli gonfiori nel sito dell'inoculo e/o lieve febbre, di breve durata.

#### Precauzioni particolari

- Vaccinare solo animali in buono stato di salute;
- Somministrare il vaccino sterilmente.

#### Modalità di somministrazione

Agitare prima dell'utilizzo evitando la formazione di bolle, poiché queste potrebbero aumentare la reazione locale nel sito di inoculo.

La dose è di **1 ml** da somministrare sottocute secondo il seguente schema vaccinale:

#### OVINI Prima immunizzazione:

- prima iniezione: per gli ovini di età superiore a 3 mesi d'età.
- seconda iniezione: un mese dopo.



## Allegato n. 1

### **Richiamo:**

Una iniezione entro sei mesi dall'ultima somministrazione di vaccino.

### **BOVINI Prima immunizzazione:**

- o prima iniezione: a partire da 3 mesi d'età;
- o seconda iniezione dopo un mese dalla prima.

### **Inoculazione contestuale di altri sierotipi**

Il vaccino può essere inoculato contestualmente ad altri vaccini per la BT **di tipo inattivato**, purché in punti di inoculo differenti. Tuttavia, per massimizzare l'effetto immunogeno del vaccino stesso e la durata della copertura immunitaria, è consigliabile utilizzare tale pratica vaccinale solo in caso di effettiva necessità, quale ad esempio la movimentazione.

### **Movimentazione**

Gli animali vaccinati possono essere movimentati senza vincoli anche in caso di circolazione virale accertata da sierotipo BTV8 nel territorio di origine e di destinazione, dopo almeno 3 settimane e non oltre sei mesi dall'ultima vaccinazione.

### **Sovradosaggio ed antidoti**

Nessun effetto eccetto quelli sopra citati sono stati osservati in caso di sovradosaggio.

### **Tempo di sospensione**

Nessuno

### **Incompatibilità**

Non miscelare con altri vaccini.

### **Modalità di conservazione**

Conservare tra i +2°C and +8°C. Dopo l'apertura del flacone il vaccino può essere utilizzato entro le 24 h successive se viene conservato a queste temperature. Tenere al riparo della luce. Non congelare.